

2月13日(日)まで **まん延防止等重点措置**を実施中

— 引き続き、感染防止にご協力ください —

よくある質問

**Q** 武田／モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

**A** 武田／モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量です。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの症状が少ないことが報告されています。  
※接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。  
出典：特例承認に係る報告書

**Q** ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

**A** 1・2回目の接種では、ファイザー社と武田／モデルナ社のいずれも2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果※が維持されています。2つのワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田／モデルナ社のワクチンの方が、感染予防・発症予防・重症化予防の効果が高かったと報告されています。  
※重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

(厚生労働省作成リーフレットより)

## 福生病院でも追加接種（3回目）を受けることができます

日時 2月8日(火)～5月18日(水)の毎週水曜日、正午～午後1時30分（祝日と4月6日(水)を除く）

※2月中は毎週火曜日も行います。

会場 公立福生病院1階多目的ホール

申込み 「接種券一体型予診票」が届いてから、羽村市コロナワクチンコールセンターに電話するかインターネット予約サイトから予約してください。

※福生病院では予約を受け付けていません。

※予約は接種日の6日前に締め切ります。

※福生病院の診察券を持っている方は持参してください。

※接種時に「接種券一体型予診票」を忘れると接種できません。

※密を避けるため、予約した時間にお越しください。

※詳しくは市公式サイトをご覧ください。羽村市コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。




▲市公式サイト



問合せ 羽村市コロナワクチンコールセンター ☎ 0570-030207

電話受付…午前9時～午後5時（土・日曜日、祝日を含む）

※電話リレーサービスの利用を希望する方はコールセンターの利用ができませんので、健康課まで電話してください。羽村市健康課 ☎ 555-1111 (☎ 627～630)



## 追加接種（3回目の接種）で使用するワクチン

追加接種では、1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田／モデルナ社のワクチンを接種することができます。羽村市の集団接種会場では3月以降ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンを併用します。日時指定の対象となる方はあらかじめワクチンの種類も指定しますが、変更も可能です。ただし、変更できる数には限りがあるため、接種日が予定より後になる場合があります。変更を希望する場合は、日時指定の通知が届いたら羽村市コロナワクチンコールセンターに連絡してください。

### 3回目接種の安全性と効果

ファイザー社および武田／モデルナ社のワクチンの、3回目の接種後7日以内の副反応は、どちらもおおむね1・2回目と同様の症状が見られました。3回目の接種をした人の方が、していない人よりも新型コロナウイルスに感染・重症化する人が少ないと報告されています。  
(厚生労働省リーフレットより)

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、疲労(65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10-50%	頭痛(54.0→48.4%)、筋肉痛(39.3→39.1%) 悪寒(37.8→29.1%)、関節痛(23.8→25.3%)	筋肉痛(58.1→49.1%)、関節痛(42.9→41.3%) 悪寒(44.3→35.3%)、リンパ節症(14.2→20.4%)
1-10%	38度以上の発熱(16.4→8.7%) 腫脹(6.8→8.0%)、発赤(5.6→5.9%) リンパ節症※(0.4→5.2%)	38度以上の発熱(15.5→6.6%) 腫脹・硬結(12.3→5.4%) 紅斑・発赤(8.7→4.8%)

※対象/人数：ファイザー2回目16～55歳/2,682人、ファイザー3回目18～55歳/289人、モデルナ2回目18歳以上/14,691人、モデルナ3回目18歳以上/167人

※2回目接種と比べた3回目接種での発現割合：■5ポイント以上少ないもの ■5ポイント以上多いもの

※武田／モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100μg、3回目は50μg接種している。

※ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載

### 1・2回目と異なるワクチンを用いた3回目接種した場合の安全性と効果

追加接種で、交接種（初回接種と追加接種のワクチンの種類が異なること）を行った場合の安全性と副反応については次のとおり報告されています。（厚生労働省リーフレットより）

#### ■安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容されています。

#### ■効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田／モデルナ社ワクチン※を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇することがわかっています。

※武田／モデルナ社ワクチンは、3回目を100μg接種した結果

ワクチンの組み合わせ	抗体価
ファイザー → ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー → ファイザー → ファイザー	

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021